

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-57

6 AVRIL 1982

Destiné aux agriculteurs du LAURAGAIS

AVERTISSEMENT N° 1

(rédigé en collaboration avec la Ferme de LOUDES, les GVA
et les CIVAM de l'Aude)

COLZA

Les Meligethes sont présents sur de nombreuses cultures.

Les seuils d'intervention sont les suivants :

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - stade D2 (Boutons accolés) | - 1 Meligethe par Plante |
| - stade E (Boutons séparés) | - 2 Meligethes par plante. |

D₂ Inflorescence principale dégagée.
Boutons accolés.
Inflorescences secondaires visibles



Au cours de ce stade, la tige atteint et dépasse la hauteur de 20 cm mesurée entre la base de la rosette et les bouquets floraux

E - Boutons séparés



AVANT DE TRAITER, L'OBSERVATION S'IMPOSE SUR UN MINIMUM DE
50 PLANTS par PARCELLE

En cas de nécessité traiter à l'aide de TORAK E (Sopra) à raison de 1,25 L à l'hectare de produit commercial, correspondant à 600 grammes de Dialiphos, cette matière active n'est pas dangereuse pour les abeilles.

AU STADE DEBUT FLORAISON NE PLUS INTERVENIR


4050 45051
1982-n°1-8

F 23

POIS PROTEAGINEUX :

VISITEZ VOS CULTURES

L'anthracnose est déjà présente dans certaines parcelles, plus particulièrement sur les moins vigoureuses.



Si vous constatez les attaques décrites ci-dessus sur vos plantes.

Traitez avec PELTAR à raison de 3,5 kilogrammes de produit commercial à l'hectare.

Tirage du 6 avril 1982 - 800 exemplaires

© Bulletin Technique des Avertissements Agricoles - Montpellier 1982